



הדרכה לנטילת כדורי טאמודל (Temodal) בזמן טיפול קרינתי למח

טאמודל (Temodal) הינה תרופה כימוטרפית הניתנת דרך הפה בין השאר בשילוב עם טיפול קרינתי למח. תרופה זו מכילה לקטוז (מידע זה חשוב לרגישים ללקטוז).

תופעות לוואי שכיחות של הטאמודל (Temodal):
בחילות, ירידה בספירת הדם הלבנה ובטסיות הדם, עצירות.

הוראות לנטילת טאמודל (Temodal):
את התרופה יש לקחת בכל ימות השבוע (כולל שישי שבת).
שעת נטילת הכדורים: בימים בהם ניתנת קרינה, יש לקחת את כל המנה כשעה לפני הטיפול הקרינתי. בשישי שבת יש לקחת את הכדורים באותה שעה שנטלתם במהלך השבוע, על בטן ריקה (כשעה וחצי לאחר הארוחה).
שעה לפני נטילת הטאמודל (Temodal): יש לקחת כדור זופראן 8mg (Zofran) או קיטריל 1 מ"ג (Kytril) 1 מ"ג נגד בחילות.
פעמיים בשבוע יש לקחת אנטיביוטיקה Trimetoprim Sulphametoxazole למניעת זיהום.

מעקב שבועי:

1. ביקורת שבועית אצל הרופא המטפל במכון הקרינה (יש לקבוע תור מראש אצל המזכירות).
2. ביקורת שבועית אצל אחיות המכון (יש צורך בקביעת תור מראש אצל רחל המזכירה).
3. ביצוע ספירת דם פעם בשבוע יום לפני בדיקת הרופא/אחות.

הנחיות:

יש לפנות לרופא במכון הקרינה במקרים הבאים:

1. עליית חום מעל 38°C .
2. הופעת פריחה
3. דימום מהחניכיים, בשתן או בכל מקום אחר.
4. שינוי במצב ההכרה של המטופל.
5. פירכוסים.

תודה רבה,

צוות אחיות מכון הקרינה טלפון 03-5305823