



הדרכה לנטילת כדורי טמודאל (Temodal) ללא קרינה

טאמודל (Temoda) הינה תרופה כימוטרפית הניתנת דרך הפה. תרופה זו מכילה לקטוז (מידע זה חשוב לרגישים ללקטוז).

***הנחיות לנטילת טמודאל (Temodal):**

מינון התרופה יקבע על ידי הרופא המטפל.

את הכדורים נוטלים פעם בארבעה שבועות בימים 1-5, פעם ביום.

יום 1	יום 2	יום 3	יום 4	יום 5	יום 6	יום 7
<u>טמודאל</u>	<u>טמודאל</u>	<u>טמודאל</u>	<u>טמודאל</u>	<u>טמודאל</u>		
יום 8	יום 9	יום 10	יום 11	יום 12	יום 13	יום 14
יום 15	יום 16	יום 17	יום 18	יום 19	יום 20	יום 21
יום 22	יום 23	יום 24	יום 25	יום 26	יום 27	יום 28
יום 29 – היום הראשון למחזור טיפול הבא						

יש לקחת את הכדורים לפני השינה, על בטן ריקה (כשעתיים לאחר הארוחה) עם כוס מלאה במים או מיץ.

שעה לפני נטילת הטאמודל יש לקחת כדור זופראן (Zofran) 8mg או קיטריל (Kytril) 1mg נגד בחילות.

אין לחצות או ללעוס את הכדור.

לחולים עם בעיות בליעה – יש לקבל הדרכה כיצד ניתן לתת את הכדור דרך זונדה / PEG.

במידה והקאת לאחר נטילת הטאמודל, (Temodal): אין ליטול מנה נוספת אלא להתייעץ עם הרופא או האחיות.

מותר לקחת כדור נוסף של זופרן (Zofran) או קיטריל (Kytiril) לאחר 12 שעות במידה ומופיעה בחילה. *תופעות לוואי שכיחות של הטאמודל (Temodal):
בחילות, ירידה בספירת הדם הלבנה ובטסיות הדם, עצירות או שלשולים, כאבי ראש, עייפות.

***מעקב:**

1. ביקורת אצל הרופא המטפל, ביום הראשון לתחילת נטילת התרופה, בכל מחזור טיפול (יש לקבוע תור מראש אצל המזכירות).
2. ביצוע ספירת דם ביום הביקורת אצל הרופא, מוקדם בבוקר לפני הכניסה לרופא .

***הנחיות:**

יש לפנות לרופא המטפל במכון הקרינה או לרופא התורן במקרים הבאים:

1. עליית חום מעל 38°C .
2. הופעת פריחה
3. דימום מהחניכיים, בשתן, ביציאות או בכל מקום אחר.
4. שינוי במצב ההכרה של המטופל.
5. פירכוסים.

תודה רבה,

צוות אחיות מכון הקרינה

טלפון 03-5305823